




Syphilis Rapid Test (WB/S/P)

- Syphilis adalah IMS (Infeksi Menular Seksual) yang umum dan dapat disembuhkan yang disebabkan oleh *Treponema pallidum* (TP), yang juga dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama kehamilan atau saat lahir, yang mengakibatkan kelainan bawaan syphilis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (AS) merekomendasikan semua wanita hamil untuk diuji.
- Beberapa tahap klinis dan periode yang lama, infeksi asimtomatik merupakan karakteristik dari syphilis. Syphilis primer didefinisikan oleh adanya chancre di tempat inokulasi.
- Respon antibodi terhadap bakteri TP dapat dideteksi dalam waktu 4 sampai 7 hari setelah chancre muncul. Infeksi tetap dapat dideteksi sampai pasien menerima perawatan yang memadai.
- Syphilis Rapid Test adalah immunoassay kromatografi cepat untuk deteksi kualitatif antibodi (IgG dan IgM) terhadap TP di seluruh darah, serum atau plasma untuk membantu dalam diagnosis syphilis.

Cara Pemakaian



HASIL UJI VALIDASI

Sensitivitas	94%
Spesifisitas	100%